

第42回種子交換会後の余剰種子リスト

<赤字は追加された種子です>

番号 和名(特徴)(学名)(草丈cm、花色、原産地等)[提供者コメント][採種地] 提供者番号

-----【アオイ科】-----

- 00001 トロロアオイ(*Abelmoschus manihot*)(150-、薄黄、温暖地では多年草)77
00002 赤花ワタ(*Abelmoschus moschatus* subsp. *tuberosus*)(60-150、赤 熱帯アジア原産、多年草だが寒さに弱い)1,22
00025 カラスノゴマ(*Corchoropsis tomentosa*)(40、黄、1年草)1
00053 ハマボウ(*Hibiscus hamabo*)(200-400、黄、木、実生4年で開花)22,87
00056 ハイビスカス ロバツス(*Hibiscus lobatus*)(這性、白から淡いピンク、常緑低木、マダガスカル他)4
00063 ローゼル(*Hibiscus sabdariffa*)(100-200、クリームに暗赤、茎が赤、アフリカ西南部原産、ハーブティーの材料)1



-----【アカネ科】-----

- 00281 クチナン(*Gardenia jasminoides*)(100-300、常緑低木、白、静岡以西)1

-----【アカバナ科】-----

- 00509 アカバナ(*Epilobium pyrricholophum*)(15-90、紅紫、北海道から九州)80

-----【アジサイ科】-----

- 00780 バイカウツギ(*Philadelphus satsumi*)(100-200、白、本州から九州、日本には昔に帰化)35

-----【アブラナ科】-----

- 00931 アラビス カエルレア(*Arabis caerulea*)(5-10、白、ヨーロッパアルプス)14
00947 ハタザオ(*Arabis glabra* (NET))(50、白、二年草稀に多年草、北海道から九州)1
00964 エゾノイワハタザオ(*Arabis serrata* var. *glauca*)(10-40、白、北海道・本州(東北))6
00971 ダイセンハタザオ(*Arabis* sp.)(15-20、白)6
01140 エゾイヌナズナ(シロバナノイヌナズナ)(*Draba borealis*)(5-20、白、北海道、本州の中部地方)14,22,27
01176 シリベシナズナ(通称キリギシナズナ)(*Draba igarashii*)(10-20、白、特定国内希少種、絶滅危惧 I A類)14,27

-----【アヤメ科】-----

- 01591 アノマテカ ディバリカタ(*Anomatheca divaricata*)(=ラペイロウシア(*Lapeirousia*)アヤメ科)24
01761 ディエテス イリデイオイデス(*Dietes iridioides*)(60、白と中心部黄、青、関東平暖地で鉢植え屋外可能、南アフリカ)76



- 01780-1 ヒメヒオウギ(フリーシア ラクサ、旧アノマテカ ラクサ)(色混合)(*Freesia laxa*)(10-15、半耐寒性、南アフリカ)3
01781 ヒメヒオウギ白(フリーシア ラクサ アルバ(旧アノマテカ ラクサ アルバ))(*Freesia laxa alba*)(10-15、白、半耐寒性、南アフリカ)1,18
01782 ヒメヒオウギ赤(フリーシア ラクサ レッド(旧アノマテカ ラクサ レッド))(*Freesia laxa red*)(10-15、赤、半耐寒性、南アフリカ)1
01786 フリーシア ムイリー(*Freesia x muirii*)(白(黄スポット)、10-20、半耐寒性)81



- 01860 チリアヤメ(*Herbertia amoena*)(10、青紫、耐寒性は強くない、チリ、アルゼンチン)24,27
01910 ヒオウギ(*Iris (Belamcanda) chinensis*)(50-100、橙・赤点、耐寒性は比較的ある)19,28,31

- 01912 ベラムカンダ フラベルタ「ハロー イエロー」(*Iris (Belamcanda) flabellata* 'Hellow Yellow')(30-50、黄、俗称キバナヒオウギ)1
- 01946-1 ハナショウブ(伊勢系、園芸品種)(*Iris ensata*)(園芸品種のため、花の色などは固定できていない)28
- 01950 イリス フォエティディッシマ(*Iris foetidissima*)(灰青、種子は緋色、独得の臭気)84
- 01965 カキツバタ(*Iris laevigata*)(50-80、青、紫、白他、水を好む)1
- 01996 アヤメ(*Iris sanguinea*)(50、青紫、日本全土、山野の草地)80
- 01999 ヒオウギアヤメ(*Iris setosa*)(30-90、青紫、本州中部以北北海道、本州では高山の湿地、北海道では平地の湿地)14
- 02095 メラスフェルラ ラモサ(*Melasmaerula ramosa*)(クリーム白~黄、花(芳香あり)は小さい、夏眠性、南アフリカ)11,35
- 02316 トリトニア パーヴァラ(*Tritonia parvula*)(20-30、橙、ヒメアヤメと称することがある)26
- 【イグサ科】-----
- 02421 スズメノヤリ(*Luzula capitata*)(10-30(花茎))87
- 【イソマツ科】-----
- 02451 チシマハマカンザシ(*Armeria armeria* ssp. *arctica*)(10-20、白、赤、北千島)14
- 02454 アルメリア カエスピトサ(ヒメハマカンザシ)(*Armeria caspitosa*)(5-15、ピンク、日当たり)14
- 【イヌサフラン科】-----
- 02580 トウチクラン(*Disporum cantoniense*)(50-100、薄黄/紫、中国原産)1
- 【イネ科】-----
- 02762 ヒメアブラススキ(*Bothriochloa parviflora*)(80、丘陵地、草原、日本では関東以西、琉球、小笠原まで)16
- 02802 ヒメコバンソウ(*Briza minor*)(10-60、ヨーロッパ原産、帰化植物)16
- 02960 ジュズダマ(*Coix lachryma-jobi*)(100、一年草、熱帯アジア原産)1
- 03314 ムギクサ(*Hordeum murinum*)(20-50、一年草もしくは越年草、帰化植物、本州以南に分布)22
- 03385 ウサギノオ(ウサギノシツポ、ラグラス)(*Lagurus ovatus*)(20-30、淡茶、一年草)[秋播きのため、26年秋に播種のこと、冷蔵庫保管]22
- 03580-2 イネ(赤米)(*Oryza sativa*)22
- 03581 イネ(アカノギ、赤禾)(*Oryza sativa* 'Akanogi')(50-60、ノギの無いタイプ)25
- 03607 パニカム ビルガツム「チョコラータ」(*Panicum virgatum* 'Chocolata')(100-130、原種の原産地は北アメリカ、耐寒性あり)22
- 03643 アオチカラシバ(*Pennisetum alopecuroides* f. *viridescens*)(50、チカラシバの素心)11,23
- 03960-1 コムギ(斑入り)(*Triticum aestivum*)[斑入りの発現率は不明、秋播きのため、26年秋に播種のこと、冷蔵庫保管]22
- 【イワタバコ科】-----
- 04360 シンニンギア レウコトリカ(*Sinningia leucotricha*)(30、橙、塊根植物、断崖の女王とも呼ばれる)[播種時期は夏、ミズゴケの上に播種]3,90
- 04370-B マツムラソウ(ムカゴ)(*Titanotrichum oldhamii*)(15-30、黄、常緑多年草、湿った岩壁、石垣西表、絶滅危惧 I A 類)[植え付け後は、室内で発根させてください]90
- 【ウコギ科】-----
- 04455 タカノツメ(*Gamblea innovans*)(落葉高木、淡い緑色、北海道南部から九州)22
- 【ウマノスズクサ科】-----
- 04512 ウマノスズクサ(*Aristolochia debilis*)(ツル植物、多年草)28
- 04513 アリストロキア フィムブリアタ(*Aristolochia fimbriata*)(ツル植物、多年草、耐寒性はあまりない)79
- 04650 サルマ ヘンリー(*Saruma henryi*)(20、黄、耐寒性あり、中国南部)32
- 【ウリ科】-----
- 04760 スズメウリ(*Melothria japonica*)(200、白、灰白(果実1-3))1
- 04782-W2 (W)カラスウリ(実が丸形)(*Trichosanthes cucumeroides*)(蔓性多年草、雌雄異株、本州四国九州)[愛知県]1
- 04782-W3 (W)カラスウリ(実は変形)(*Trichosanthes cucumeroides*)(蔓性多年草、雌雄異株、本州四国九州)[愛知県]1
- 04782-W4 (W)カラスウリ(実は俵形)(*Trichosanthes cucumeroides*)(蔓性多年草、雌雄異株、本州四国九州)[愛知県]1
- 【オオバコ科】-----
- 04892 矮性黄花ジギタリス「カリヨン」(*Digitalis grandiflora* 'Carillion')(20-40、黄白)14,90
- 05135 ペンステモン園芸種(同定はできない)(*Penstemon* sp.)11
- 05161-2 サザエオオバコ(通称)(*Plantago asiatica*)(斑入サザエ葉)22

- 05317 クガイソウ(*Veronicastrum sibiricum* ssp. *japonicum*)(50、紫、本州、日当たりのよい草地や林の縁)10,12,24,28
-----【オトギリソウ科】-----
- 05440 ヒペリクム アンドロサエムム(コボウズオトギリ(通称))(*Hypericum androsaemum*)(30-100、黄、半落葉小低木、欧州、北米に広く分布)1,79
- 05443 トモエソウ(*Hypericum ascyron*)(50-130、黄、北海道から九州、日当たりの良い草地)14
- 05466 ヒメオトギリ(*Hypericum japonicum*)(15-40、黄、1年草、北海道から九州)1
- 05505 エゾオトギリ(*Hypericum yezoense*)(10-30、黄、絶滅危惧Ⅱ類)84
-----【オミナエシ科】-----
- 05524 オミナエシ(*Patrinia scabiosifolia*)(60-100、黄、日当たりの良い山地、北海道から九州)1
- 05533 オトコオミナエシ(*Patrinia x hybrida*)(60-100、白から黄、オミナエシとオトコエシの自然交雑種)27
-----【オモダカ科】-----
- 05569 オモダカ(*Sagittaria trifolia*)(葉の長さは7-40、白、北海道から沖縄、水田の雑草ともなっている)1
- 05572-B クワイ(球根)(*Sagittaria trifolia* var. *edulis*)(100-120、白、雌雄異株、日本産のものをアオグワイと称する)25
-----【カキノキ科】-----
- 05583 ロウヤガキ(老鴉柿)(*Diospyros rhombifolia*)(雌雄異株、中国原産、日当たりを好む)30
-----【カヤツリグサ科】-----
- 05797 イガグリスゲ(*Carex grayi*)(湿生植物、北アメリカ東部原産)11
- 05833 ナキリスゲ(*Carex lenta*)(-50、関東新潟以西の本州、四国、九州)16
- 05857 ミタケスゲ(*Carex michauxiana* var. *asiatica*)(標高の高い高層湿原)14
- 05901 テンジクスゲ(*Carex phyllocephala*)(30-50、常緑多年草、中国原産、一部野生化)[種子交換会で精製再分包]32
-----【キキョウ科】-----
- 06282 ソバナ(*Adenophora remotiflora*)(40-50、紫、本州四国九州、林縁など)12
- 06282-W (W)ソバナ(*Adenophora remotiflora*)(40-50、紫、本州四国九州、林縁など)[山梨県]77
- 06303-W (W)ツリガネニンジン(*Adenophora triphylla* var. *japonica*)(50-100、青、北海道から九州、山野や土手)[愛知県]1
- 06489 ホタルブクロ(*Campanula punctata*)(50、紫)1
- 06494 ヤマホタルブクロ(*Campanula punctata* var. *hondoensis*)(20-60、薄紫、ホタルブクロの変種、ホタルブクロと違って萼と萼の間に付属片がついていない)1
- 06505 ハタザオギキョウ(カンパヌラ ラプンクロイデス)(*Campanula rapunculoides*)(50-120、青、ヨーロッパ原産)3
- 06601 ツルニンジン(*Codonopsis lanceolata*)(ツル性、白緑紫褐色の斑点、別名ジイソブ、根は滋養強壮とヘルニア特効薬)86
- 06601-W (W)ツルニンジン(*Codonopsis lanceolata*)(ツル性、白緑紫褐色の斑点、別名ジイソブ、根は滋養強壮とヘルニア特効薬北海道から九州、平地や山地の林の中や縁)[長野県]71
- 06712 ベニバナサワギキョウ(*Lobelia cardinalis*)(30-40、赤、北アメリカ中・東部原産)27,82,87
- 06719 サワギキョウ(*Lobelia sessilifolia*)(40-80、濃青紫、平地や山地の湿地)87
- 06780 キキョウ(*Platycodon grandiflorum*)(30-60、青)31
- 06780-12 キキョウ(白)(*Platycodon grandiflorum* white)(30-60、白)31
- 06781 アポイギキョウ(アポイ岳系、紫、)(*Platycodon grandiflorum* 'Apoigikyō')(20、青紫)6
-----【キク科】-----
- 07375 ベニバナ(*Carthamus tinctorius*)(100位、黄、1年草もしくは越年草)22
- 07596 ノハラアザミ(*Cirsium oligophyllum*)(60-100、赤紫、本州中部以北)12,25
- 07615-W (W)スズカアザミ(*Cirsium suzukaense*)(100-150、赤紫、東海地方)[愛知県]1
- 07956 フジバカマ(*Eupatorium japonicum*)(70、ほぼ白、種子の稔性は悪い、サワヒヨドリとの交雑種(サワフジバカマ)が流通している)[シイナが多い]28
- 07958 サケバヒヨドリ(*Eupatorium laciniatum*)(50-100、濃ピンク)27
- 07965 キクバフジバカマ(*Eupatorium* sp.)(フジバカマより小柄、玉咲き、葉は区切れている)26,80
- 08150 チシマタンポポ(通称)(ヒエラキウム アルピヌム)(*Hieracium alpinum*)(10-20、黄、アルプス、ヨーロッパ)6,80
- 08325 センボンヤリ(*Leibnitzia anandria*)(9-12(草丈)、30-60(花丈)、白、秋に閉鎖花、北海道、本州、東アジア)11
- 08989 タラクサカム ディールバトム(*Tanacetum* aff. *Dealbatum*)(10-15、白からピンクに変化、中国)[2019年香港から種子輸入]19
- 08990 シロバナタンポポ(*Taraxacum albidum*)(30ぐらい、他のタンポポより舌状花が少なく白色、単為生殖可能、本州関東以西)87
- 09021 シコタンタンポポ(*Taraxacum shikotanense*)(20、黄、外そうほう片がやや細長い)14

—————【キジカクシ科(クサスギカズラ科)】—————

- 09335 ウラジロギボウシ(*Hosta hypoleuca*)(大型、白花多花性、葉裏は粉白、愛知県 希少種、絶滅危惧 I B類)[オオバギボウシの裏白タイプとも言われることがある]25
- 09355 ミズギボウシ(別名ナガバミズギボウシ)(*Hosta longissima* var. *brevifolia*)(40-70、薄い紫、愛知以西四国九州)84
- 09388 タチギボウシ(ニシキギギボウシ)(*Hosta sieboldii* var. *rectifolia*)(60-100(茎)、薄青紫、本州中部以北北海道)87
- 09452 ラケナリア レフレクサ(*Lachenalia (Polyxena) reflexa*)(10-20、黄)3
- 09461 ヤブラン(*Liriope muscari*)(40、淡紫、日本各地)1
- 09588 ヒメズイ(*Polygonatum humile*)(10-20、白緑、北海道から九州、山地海岸)72
- 09647 ツルボ(*Scilla scilloides*)1

—————【キョウチクトウ科】—————

- 09745 チョウジソウ(*Amsonia elliptica*)(30-50、青紫)3,6,90
- 09845 クサナギオゴケ(*Vincetoxicum katoi*)(-100、赤紫、千葉以西四国九州、日本固有種、絶滅危惧種 II 類)81

—————【キンポウゲ科】—————

- 10010 オオバシヨウマ(*Actaea (Cimicifuga) acerina*)40-120(花茎)、白、日本固有種、本州九州四国)90
- 10017-W (W)サラシナシヨウマ(*Actaea (Cimicifuga) simplex*)(40-150、白、北海道から九州)[山梨県]77
- 10077 プルサチラ ゲオルギガ(*Anemone (Pulsatilla) georgiga*)(15-20、花卉内側は白・外側は淡青)14
- 10117 プルサチラ ブルガリス(セイヨウオキナグサ) アルバ(*Anemone (Pulsatilla) vulgaris 'Alba'*)(20、白)14
- 10150 アネモネ アルタイカ(*Anemone altaica*)(30-50、グリーン系)35,90



- 10242 ハルザキシユウメイギク(通称)(アネモネ ヴァージニアナ)(*Anemone virginiana*)(50-60、白)28
- 10270 レンゲシヨウマ(*Anemonopsis macrophylla*)(40-60、白、僅かに桃)7,90
- 10270-3 レンゲシヨウマ(泥軸、白花)(*Anemonopsis macrophylla*)(40-60、白、茶褐色の茎)9
- 10270-4 レンゲシヨウマ(八重咲き)(*Anemonopsis macrophylla*)(40-60、白、僅かに桃、ほぼ二重)9,90
- 10280 アクイレギア アルピナ(*Aquilegia alpina*)(15-30、紫、アルプス)14
- 10293 ヤマオダマキ(*Aquilegia buergeriana*)(30-50、海老茶・黄、距が曲がらずまっすぐ、北海道から九州、草地、林縁)8,11,13,14
- 10296 キバナノヤマオダマキ(*Aquilegia buergeriana* f. *flavescens*)(30-60、黄、日本固有種、北海道から九州)84
- 10296-W (W)キバナノヤマオダマキ(*Aquilegia buergeriana* f. *flavescens*)(30-60、黄、日本固有種、北海道から九州)[長野県]71
- 10316 アクイレギア クリサンタ(*Aquilegia chrysantha*)(50、黄、アメリカ原産)82
- 10332 フウリンオダマキ(*Aquilegia ecalcarata*)(20-30、白薄い紫、中国、1800-3500m)20
- 10332-3 オトメフウリンオダマキ(*Aquilegia ecalcarata* hybrids)(赤、フウリンオダマキの園芸品種)14
- 10347 オダマキ(ピンク)(園芸種?)(*Aquilegia flabellata 'pink'*)(25-40、ピンク)[種子交換会で精製再分包]32
- 10348 オダマキ(紫)(園芸種?)(*Aquilegia flabellata 'purple'*)(25-50、)[種子交換会で精製再分包]32
- 10348-2 オダマキ(青紫)(白の舌、園芸種?)(*Aquilegia flabellata 'purple'*)(25-50、)1
- 10350 オダマキ(白)(園芸種?)(*Aquilegia flabellata 'white'*)(25-40、白)[種子交換会で精製再分包]32
- 10352 ミヤマオダマキ(*Aquilegia flabellata* var. *pumila*)(10-20、紫、葉が3全分裂する。オダマキは完全に分裂しない)14
- 10352-E3 ミヤマオダマキ(八甲田山系)(*Aquilegia flabellata* var. *pumila*)(紫白)[矮性]14
- 10354 ミヤマオダマキ(白)(*Aquilegia flabellata* var. *pumila* f. *alba*)(40、青、一年草、本州から沖縄)13,14,85
- 10410 アクイレギア ロッキー(*Aquilegia rockii*)(30-60、紫、フウリンオダマキとオオヤマオダマキの自然交雑種、四川省雲南省2500-3500m)14
- 10441 クロバナオダマキ(*Aquilegia viridiflora*)(30、暗黒紫)3
- 10444 アクイレギア ブルガリス(*Aquilegia vulgaris*)(10-20、濃紫、リップは白)1,14
- 10450 アクイレギア ブルガリス「ブラック バルロウ」(*Aquilegia vulgaris 'Black Barlow'*)(菊花、選抜種)14
- 10461 アクイレギア ブルガリス「ノラ バルロウ」(*Aquilegia vulgaris 'Nora Barlow'*)(菊花、選抜種)14
- 10466 アクイレギア ブルガリス(園芸種、赤花)(*Aquilegia vulgaris* sp.)(赤)14
- 10470 アクイレギア ヴルガリス「ホワイトバルロー」(*Aquilegia vulgaris 'White barlow'*)(園芸種)14
- 10474 アクイレギア ブルガリス バリエガタ(*Aquilegia vulgaris* Variegated)(60、青紫、胡麻斑葉)14

- 10484 キリギシソウ(*Callianthemum sachalinense* subsp. *kirigishiense*)(10-20、白、石灰岩の草地、北海道(岨山)(固有)、特定国内希少種(種子規制)、絶滅危惧IA類)21
- 10536 クレマチス ヘラクレイフォリア(*Clematis heracleifolia*)(50-100、青、中国北部、朝鮮半島)90
- 10541-W (W)ハンショウヅル(*Clematis japonica*)(ツル性、赤、紫、日本固有種、本州~九州)[長野県]72
- 10580 カザグルマ(*Clematis patens*)(ツル性、薄い紫、秋田から九州)74,84,90
- 10581 シロバナカザグルマ(*Clematis patens* f. *leucantha*)(ツル性、白、秋田から九州)3,8
- 10750 シラネアオイ(*Glaucidium palmatum*)(40、淡赤紫、亜高山から高山帯、中部以北北海道)7,90
- 10753-W (W)シラネアオイ(白)(*Glaucidium palmatum* var. *leucanthum*)(40、白、亜高山から高山帯、中部以北北海道)[新潟県]77
- 10863 スハマソウ(*Hepatica nobilis* var. *japonica* f. *variegata*)(10-15、白、薄いピンク、岩手以南~神奈川)[乾燥種子]87
- 10899 コミヤマキンポウゲ(通称)(*Ranunculus acris* ssp. *novus*)(10-20、黄、多年草)14
- 10901 ミヤマキンポウゲ(*Ranunculus acris* var. *nipponicus*)(10-50、黄、高山の草地)14,84
- 10946 ラヌンクルス・ラップニコス(*Ranunculus lapponicus*)(5-10、黄、北米圏)14
- 11052 アキカラマツ(*Thalictrum minus* var. *hypoleucum*)(60-130、淡黄白、北海道から南西諸島)1
- 11066 シキンカラマツ(*Thalictrum rochebrunianum*)(60、淡桃、長野、群馬、福島)1
- 11079 ムラサキカラマツ(*Thalictrum uchiyamae*)(50、薄紫、対馬と済州島のみ分布、特定国内希少種、絶滅危惧IB類)14,84
- 11109 トロリウス ラクサス(*Trollius laxus*)(60、クリーム、ロッキー山脈)14
- 【クスノキ科】-----
- 11158 ヤマコウバシ(*Lindera glauca*)(落葉低木、オレンジ色に紅葉、雌雄異株だが日本には雌株のみ存在、雌株だけで種子を作る)22
- 【クロウメモドキ科】-----
- 11380-W (W)ケンポナシ(*Hovenia dulcis*)(落葉高木、淡黄緑色の花、北海道奥尻から九州まで、果柄が食用)[滋賀県]22
- 【クワ科】-----
- 11490 ガビサンイヌビワ(*Ficus erecta gabisan*)(100-200、中国産)13
- 【ケシ科】-----
- 11613 ディセントラ エクシミア アルバ(ヒメケマンソウ白)(*Dicentra eximia alba*)(15、白、北アメリカ)14
- 11625 コマクサ「丹頂」(*Dicentra peregrina* 'Tanchou')(白、口元に紅)20,21
- 11627 赤花四季咲きコマクサ(*Dicentra peregrina* × *D.eximia*)(コマクサとヒメケマンソウの交配種)21
- 11628 白花四季咲きコマクサ(*Dicentra peregrina* × *D.eximia*)(コマクサとヒメケマンソウの交配種)21
- 11691 メコノプシス カンブリカ(*Meconopsis cambrica*)(30、橙、ヨーロッパ)14
- 11765 パパベル アトランチックム(*Papaver atlanticum*)(30-60、オレンジ、短命な多年草、別名アトランティックポピー、モロッコ)14
- 【ゴマノハグサ科】-----
- 12100-W (W)シソクサ(*Limnophila chinensis* ssp. *aromatica*)(15-25、白、湿地、本州から沖縄)[愛知県]1
- 12252 エゾヒナノウスツボ(*Scrophularia grayana*)(90-150、赤紫、南千島、北海道、青森岩手)84
- 【コミカンソウ科】-----
- 12335 コミカンソウ(*Phyllanthus urinaria*)(15-30、橙、一年草、本州から沖縄)11
- 【サクラソウ科】-----
- 12381 ルリハコベ(*Anagallis arvensis* f. *coerulea*)(10-20、青紫、1年草、伊豆七島・紀伊半島・四国・九州・琉球)33
- 12465 アンドロサケ セプトントリオナリス(*Androsace septentrionalis*)(10-20、白、1年草)14
- 12694 オカトラノオ(*Lysimachia clethroides*)(60-100、白、北海道から九州、朝鮮、中国)[種子交換会でシイナ分離、少量]6
- 12713 クサレダマ(*Lysimachia vulgaris* var. *davurica*)(80、黄色、北海道から九州)1,12
- 【サトイモ科】-----
- 13170 マイヅルテンナンショウ(*Arisaema heterophyllum*)(60-100、雄性個体と両性個体のみ存在、岩手から鹿児島、川沿いの草地、子球を作りやすい、絶滅危惧II類)15,33
- 13170-B マイヅルテンナンショウ(小球)(*Arisaema heterophyllum*)(60-100、雄性個体と両性個体のみ存在、岩手から鹿児島、川沿いの草地、子球を作りやすい、絶滅危惧II類)27
- 13202 ムサシアブミ(*Arisaema ringens*)(40、関東以西、四国九州)79
- 13202-B ムサシアブミ(球根)(*Arisaema ringens*)1

- 13208-2 アオмамシグサ(*Arisaema serratum*)(マムシグサの仏炎苞は淡緑褐色～紫褐色、緑色のものはアオмамシグサと呼ぶことがある)33
- 13303-WB (W)カラスビシャク(球根)(*Pinellia ternata*)(20-40、仏炎苞、紫、ムカゴ、繁殖力旺盛で栽培に注意)[愛知県]1
- 13306-B オオハンゲ(球根)(*Pinellia tripartita*)(20-50、緑に帯紫、本州中部から沖縄)1

-----【シオデ科(サルトリイバラ科)】-----

- 13382-W (W)サルトリイバラ(サンキライ)(*Smilax china* var. *yanagitai*)(つる性、赤実鑑賞、山野、北海道から九州)[愛知県]1

-----【シソ科】-----

- 13493 コムラサキ(*Gallicarpa dichotoma*)(50-200、紫実、葉柄と花柄の位置がわずかずれている)1
- 13497 ムラサキシキブ(*Gallicarpa japonica*)(200-300、紫実、葉柄と花柄の位置は近接している)32
- 14201 カリガネソウ(*Caryopteris divaricata*)(30-100、青紫、全草に特有の臭気、北海道から九州)1,6,72
- 14202 カリガネソウ(桃)(*Caryopteris divaricata* pink)90
- 14204 ダングク(*Caryopteris incana*)(70-80、白、青、紫、絶滅危惧Ⅱ類)27,29,35
- 14204-1 ダングク(ピンク)(*Caryopteris incana*)(70-80、ピンク)1,28
- 14232-W (W)クサギ(*Clerodendrum trichotomum*)(落葉低木、白、枝や葉に悪臭、北海道から奄美諸島)[愛知県]1
- 14306 ナギナタコウジュ(*Elsholtzia ciliata*)1
- 14374 アキチヨウジ(*Isodon longitubus*)(60-90、青、長野以西)[少量]35
- 14375 シロバナアキチヨウジ(*Isodon longitubus* white fl.)(60-90、白、長野以西)90
- 14404 オドリコソウ(*Lamium barbatum*)(30-50、ピンク、北海道から九州)26
- 14440 メハジキ(*Leonurus japonicus*)(50-100、淡紅紫、2年草)81
- 14441 キセワタ(*Leonurus macranthus*)(60-100、淡紅紫、絶滅危惧Ⅱ類)7,90
- 14525 タイマツバナ(*Monarda didyma*)(100、赤紫、北アメリカ、ベルガモット、園芸品種が多い)1
- 14635-1 ウツボグサ(桃花)(*Prunella vulgaris* ssp. *asiatica*)(20、桃、北海道から沖縄)84
- 14688 アキノタムラソウ(*Salvia japonica*)(20-50、青紫、山形から九州)1,90
- 14700 キバナアキギリ(*Salvia nipponica*)(20-30、黄、本州から九州)10
- 14700-W (W)キバナアキギリ(*Salvia nipponica*)(20-30、黄、本州から九州)[東京都]77
- 14758-1 タツナミソウ(濃色、矮性)(*Scutellaria indica*)[根が旺盛、混色に注意]22
- 14759 タツナミソウ(白)(*Scutellaria indica* 'Alba')(20-30、白、東北地方南部から九州、低山)22
- 14760 タツナミソウ(桃)(*Scutellaria indica* pink fl.)(20-30、桃、東北地方南部から九州、低山)22
- 14767 シソバツナミ(シソバツナミソウ)(*Scutellaria laeteviolacea*)(10-15、青紫花、東北地方南部から九州)3,14
- 14829 イヌゴマ(*Stachys riederi* var. *intermedia*)(30-70、淡紅、北海道から九州)17
- 14871 ニンジンボク(中国ニンジンボク)(*Vitex cannabifolia*)(100-300灌木、薄い紫 原産地は中国、切花に良い)12
- 14873 ハマゴウ(*Vitex rotundifolia*)(50-100、灌木、青紫、東北地方南部から九州、海岸の砂地)1

-----【シュロソウ科】-----

- 14921 シライソウ(*Chionographis japonica*)(20-40、白、秋田から九州、山地)11,90

-----【ショウガ科】-----

- 15086 ジンジャーリリ(*Hedychium* sp.)(ジンジャーの園芸品種)[種子に親株の遺伝情報が伝わるか確認できていない]1

-----【スイカズラ科】-----

- 15420-W (W)マツムシソウ(*Scabiosa japonica*)(50-90、淡青紫、通常開花すると枯れる。北海道から九州、草原)[広島県]18
- 15420-W1 (W)マツムシソウ(*Scabiosa japonica*)(50-90、淡青紫、通常開花すると枯れる。北海道から九州、草原)[長野県]84
- 15426 ソナレマツムシソウ(*Scabiosa japonica* var. *littoralis*)(10-30、青紫、多年草、関東、海岸、絶滅危惧Ⅱ類)8,23,85

-----【ススキノキ科】-----

- 15611 ユウスゲ(キスゲ)(*Hemerocallis citrina* var. *vespertina*)(100-150、橙黄、本州から九州、山地の草原)8,13,81
- 15618 ハマカンゾウ(*Hemerocallis fulva* var. *littorea*)(50-80、橙、関東から沖縄、海岸)79

-----【スミレ科】-----

- 15765-3 ヒゴスミレ(素心)(*Viola chaerophylloides* var. *sieboldiana*)(青軸)6
- 15803 エイザンスミレ(*Viola eizanensis*)(10-20、淡紅から濃紅紫、芳香、葉は深く切れ込む、本州・四国・九州)29
- 15910 アツバスミレ「二色アツバスミレ」(*Viola mandshurica* var. *triangularis* f. *bicolor*)(10、白・紫)29

- 15930-2 ニオイタチツボスミレ(丈が混合、色混合)(*Viola obtusa*)1
 15951 クワガタスミレ(*Viola palmate*)(10、青紫、葉に深い切れ込み、帰化植物、北米)70
 16023 雲南スミレ(*Viola sp.*)(紫、アカネスミレに似る、雲南省で採集されたとする)32
 16097 タカオスミレ(ハグロスミレ)(*Viola yezoensis* f. *discolor*)(春葉は黒褐色から茶褐色、花後色が変わる)22
 16099 アソヒカゲスミレ(*Viola yezoensis* var. *asoana*)(15、春葉は黒褐色から茶褐色、花後色が変わる)29

-----【セリ科】-----

- 16207 アストランティア マヨル(*Astrantia major*)(白色地に帯桃色、30-60、中央・西ヨーロッパ原産)90



- 16243 ミシマサイコ(*Bupleurum scorzoneraefolium* var. *stenophyllum*)(30-50、黄、薬草、本州四国九州、絶滅危惧Ⅱ類)17,90

- 16285-1 ムラサキミツバ(カラスバミツバ)(*Cryptotaenia canadensis* subsp. *japonica*)(40-60、小紫花、)14

-----【センリョウ科】-----

- 16510 キビヒトリシズカ(*Chloranthus fortunei*)(白、花は糸状、岡山香川九州北部、絶滅危惧Ⅱ類)13

- 16511 ガビサンヒトリシズカ(流通名?)(*Chloranthus henryi*)(30、白、花茎が下垂する)[乾燥種子]32

-----【タコノアシ科】-----

- 16525 タコノアシ(*Penthorum chinense*)(50-70、黄緑。湿地、関東以西九州)27,84

-----【タデ科】-----

- 16620-4 ミズヒキ(白花)(*Persicaria filiforme*)(30-50(地植え)、白)86

- 16621 ミズヒキ(斑入り)(*Persicaria filiforme* 'Variegata')[白花]10

- 16624 ミズヒキ(斑入り「ペインターズ・パレット」)(*Persicaria filiformis* 'Painter's Palette')(40、赤白、斑入り)79

- 16637-W (W)イヌタデ(*Persicaria longiseta*)(20-50、赤、一年草、北海道から沖縄)[愛知県]1

- 16663 ミゾソバ(*Persicaria thunbergii*)(30-80、ピンク、一年草、北海道から九州の山野の水辺)1

- 16666 アイ(通称タデアイ/アイタデ)(*Persicaria tinctoria*)(30、ピンク、藍染めの染料の原料)1

-----【チシマゼキショウ科】-----

- 16816 ハナゼキショウ(*Tofieldia nuda* var. *nuda*)(20、白)34

-----【ツツジ科】-----

- 17190-W (W)キバナシャクナゲ(*Rhododendron aureum*)(60-70、薄黄、低木、北海道から中部、高山帯から亜高山上部)[山梨県]77

- 17209-W (W)アズマシャクナゲ(*Rhododendron degronianum*)(200、淡い紅(変異多い)、本州中部から東北)[群馬県]73

-----【ツツラフジ科】-----

- 17422-W (W)アオツツラフジ(*Cocculus trilobus*)(300以上、薄黄~白、白実から変化青紫実、有毒、北海道から沖縄)[愛知県]1

- 17450 アオカズラ(*Sabia japonica*)(別名ルリビヨウタン、ツル、落葉、黄花、緑→青実、絶滅危惧ⅠB類)22

-----【ツノゴマ科】-----

- 17480 キバナツノゴマ(*Ibicella lutea*)(50、黄、一年草、外来種南米)1

-----【ツユクサ科】-----

- 17543 ツユクサ(*Commelina communis*)(25、青紫、一年草、北海道から沖縄)1

- 17552 メガネツユクサ(流通名)(*Commelina communis* white fringe fl.)(白の覆輪)33

- 17570 ヤブミョウガ(*Pollia japonica*)(50-60、白小花、関東から九州)1

-----【ツリフネソウ科】-----

- 17598 ツリフネソウ(*Impatiens textori*)(50-80、赤紫、一年草、日本各地)1

- 17599 ツリフネソウ(白)(*Impatiens textori* 'Alba')(30、白)1

- 17599-W (W)ツリフネソウ(白)(*Impatiens textori* 'Alba')(50-80、白)[新潟県]77

-----【ナス科】-----

- 17970 ホオズキ(*Physalis alkekengi* var. *franchetii*)(60、白)1

- 18002-W (W)ヒヨドリジョウゴ(*Solanum lyratum*)(ツル、秋に赤い実、山野、全国)[愛知県]88

-----【ナデシコ科】-----

- 18190 ハマナデシコ(フジナデシコ)(*Dianthus japonicus*)(15-40、濃桃、本州から沖縄、海岸)26,30
- 18252 カワラナデシコ(*Dianthus superbus* var. *longicalycinus*)(20-50、桃、萼片の長さは3-4でエゾカワラナデシコより長い、本州から九州沖縄)6,90
- 18256 シロバナカワラナデシコ(*Dianthus superbus* var. *longicalycinus* f. *albiflorus*)(20-50、白)11,81
- 18259 タカネナデシコ(シモフリナデシコ)(*Dianthus superbus* var. *speciosus*)(15、桃、エゾカワラナデシコの高山型、本州以北)6,84
- 18471 フシグロセンノウ(*Silene* (*Lychnis*) *miqueliana*)(30-70、橙赤、日本固有種、関東から九州)90
- 18471-W (W)フシグロセンノウ(*Silene* (*Lychnis*) *miqueliana*)(30-70、橙赤、日本固有種、関東から九州)[長野県]71
- 18471-W1 (W)フシグロセンノウ(*Silene* (*Lychnis*) *miqueliana*)(30-70、橙赤、日本固有種、関東から九州)[山梨県]77
- 18477 マツモトセンノウ(ツクシマツモト)(*Silene* (*Lychnis*) *sieboldii*)(30-40、紅、一般に流通するのは葉や茎に赤が混じらないツクシマツモト)84,90
- 18529 ナンバンハコベ(*Silene baccifera* var. *japonica*)(ツル状に匍匐、白、北海道から九州、山野)81
- 18529-W (W)ナンバンハコベ(*Silene baccifera* var. *japonica*)(ツル状に匍匐、白、北海道から九州、山野)[長野県]71
- 18669 タカネマンテマ(*Silene uralensis*)(10-20、白、南アルプス高山帯、特定国内希少種R5に変更、絶滅危惧 I A 類)[特定国内種事業届申請中のため、受理されてから送付となります]14
- 【ニシキギ科】-----
- 18772 ニシキギ(*Euonymus alatus*)(200-300、薄緑、落葉低木、赤実、北海道から九州)1
- 18776 コマユミ(*Euonymus alatus* f. *stiatius*)(100-300、薄緑、落葉低木、赤実、北海道から九州)1,22
- 18806 ツリバナ(*Euonymus oxyphyllus*)(100-400、淡緑、赤実、落葉低木、北海道から九州、山地)1,6
- 18812-1 マユミ(白実)(*Euonymus sieboldianus*)(100-400、淡緑、白実、落葉低木、雌雄異株、雌株だけで種子が出来る)12
- 【ヌマハコベ科】-----
- 18930 レウシア ロンギペタラ(*Lewisia longipetala*)(5-10、赤からオレンジ、北米シエラネバダ山脈)14
- 18948 レウシア ステッピンシー(*Lewisia stebbinsii*)(10、ピンク、カリフォルニア)14
- 【ハエドクソウ科】-----
- 19203 ミゾホオズキ(*Mimulus nepalensis*)(10-30、黄、北海道から九州、水辺)22
- 【ハナシノブ科】-----
- 19366 ポレモニウム レプタンス(*Polemonium reptans*)(30、淡青)14
- 【ハマウツボ科】-----
- 19420 ナンバングセル(*Aeginetia indica*)(20、赤紫、北海道から沖縄、イネ科の他ミョウガなどにも寄生)1
- 【バラ科】-----
- 19612 キンミズヒキ(黄金葉)(*Agrimonia pilosa*)22
- 19613-2 キンミズヒキ(斑入り)(*Agrimonia pilosa* var. *japonica*)(30-50(地植)、15(鉢)、黄、北海道から九州)22
- 19652-1 ボケ「世界」(*Chaenomeles sinensis* "Sekaiichi")(八重咲大輪、赤、園芸品種)[種子に親株の遺伝情報が伝わるか確認できていない]1
- 19774 ミヤマダイコンソウ(*Geum calthaefolium* var. *nipponicum*)(30、黄、本州中部以北亜高山帯から高山帯、大峰石鎚、砂礫地)70
- 19774-1 ミヤマダイコンソウ(斑入り)(*Geum calthaefolium* var. *nipponicum*)(30、黄、本州中部以北亜高山帯から高山帯、大峰石鎚、砂礫地)(黄散斑縞)83
- 19956 ポテンティラ グラキリス ヌタリ—(*Potentilla gracilis* *nuttallii*)(30-60、淡黄)24
- 19970 ユウバリキンバイ(*Potentilla matsumurae* var. *yuparensis*)(10-30、黄、絶滅危惧IB類、交換会に提供される種は別種の可能性)24
- 19989-E1 ウラジロキンバイ(*Potentilla nivea*)(20、黄、北海道、中部高山帯、絶滅危惧II類)[北海道由来]14
- 20125 シロヤマブキ(*Rhodotypos scandens*)(100、一重白、小作りには多剪定、)26,28
- 20130 オオタカネバラ(*Rosa acicularis*)(100-150、赤、北海道から中部、亜高山から高山)10
- 20134 カカヤンバラ(ヤエヤマノイバラ)(*Rosa bracteata*)(100、白、沖縄(先島諸島) 海岸の草原、荒地)74
- 20143 サンショウバラ(*Rosa hirtula*)(100-500、ピンク、富士箱根地方、絶滅危惧II類)90
- 20149-W (W)ノイバラ(*Rosa multiflora*)(-200、落葉つる低木、白、刺あり、沖縄を除く日本各地)[愛知県]1
- 20152-1 タカネバラ(白)(*Rosa nipponensis*)(100-200、白、日本固有種、中部山岳部から四国剣山など)10
- 20157 ハマナス(*Rosa rugosa*)(100-150、ピンク、北海道、南は茨城、島根)26
- 20265 ワレモコウ(*Sanguisorba officinalis*)(30-100、赤、紫、北海道から九州)1,10
- 20265-W (W)ワレモコウ(*Sanguisorba officinalis*)(30-100、赤、紫、北海道から九州)[愛知県]1
- 20363 レブンシモツケ(*Spiraea japonica* f. *bullata*?) (50、ピンク、シモツケの矮性種、礼文とか無関係)12

-----【ヒガンバナ科】-----

- 20452 アリウム アクミナツム(*Allium acuminatum*)(10-30、ピンク、アメリカ西部)84
20585 アリウム セネスケンス(流通名セッカヤマネギ、タケシマイワラッキョウ)(*Allium senescens*)(20、薄紫、外来種)84
20670 ハブランツス アンダーソニー(*Habranthus andersonii*(*Zephyranthes tubispatha*))(15-25、橙)28,79
20695 ハエマンサス アルビフロス(マユハケオモト)(*Haemanthus albiflos*)(20-30、白、南アフリカ)90
20850 ナルキسس ザイアニクス(*Narcissus zaianicus*)(20、クリーム、早咲き、モロッコ)3
20871 ノスコルドム ボナリエンセ(*Nothoscordum bonariense*)(30、白)3,24
20900 ストルマリア ディスキフェラ(*Strumaria discifer*)(20-30、白、南アフリカ)90
20908 サフランモドキ(*Zephyranthes carinata* Herb)(30、淡いピンク)1
20909 ゼフィランテス キトリナ(*Zephyranthes citrina*)(50、黄、半耐寒性)83
20932 ゼフィランテス 類(*Zephyranthes* sp)(30、淡いピンク)18

-----【ビャクダン科】-----

- 21050 ツクバネ(*Buckleya lanceolata*)(100-200、落葉小低木、雌雄異株、半寄生(ツガ、モミ、アセビ)、本州・四国・佐賀長崎大分)[親木はヒノキの寄生]72

-----【ヒルガオ科】-----

- 21208 アサガオ(茎なし)(*Ipomoea (Quamoclit) nil* very short type)(15、濃ピンク白縁)1

-----【フウロソウ科】-----

- 21345 ゲンショウコ(赤)(*Geranium nepalense* var. *thunbergii*)(30-50、赤、北海道から沖縄)1
21345-1 ゲンショウコ(白)(*Geranium nepalense* var. *thunbergii*)(30-50、白、北海道から沖縄)1
21345-3 ゲンショウコ(混合)(*Geranium nepalense* var. *thunbergii*)(30-50、赤白、北海道から沖縄)1

-----【ブドウ科】-----

- 21712 ヤマブドウ(*Vitis coignetiae*)(ツル、落葉、雌雄異株)[ヤマソーヴィニヨン、ヤマブドウとカベルネソーヴィニヨンの交配種、自家受粉]12
21712-1 ヤマブドウ(*Vitis coignetiae*)(ツル、落葉、雌雄異株)[乾燥種子]10,22
21716 エビヅル (*Vitis ficifolia* var. *lobata*)(落葉蔓性木本、黒実、本州から沖縄)[保湿管理]90

-----【ブナ科】-----

- 21886 スカーレットオーク(通称ベニガシワ)(*Quercus coccinea*)(落葉高木、紅葉を楽しむ、北米原産、オオベニガシワとは違う)22

-----【ベンケイソウ科】-----

- 21947 ミセバヤ(*Hylotelephium sieboldii*)(40、淡紅、絶滅危惧 I B類)1
21950 オオベンケイソウ(*Hylotelephium spectabile*)(25-80、ピンク、東アジア帰化植物)23

-----【ホシクサ科】-----

- 22163 オオホシクサ(*Eriocaulon buergerianum*)(15-30、白、一年草、湿地、本州から沖縄)27
22165 ホシクサ(*Eriocaulon cinereum*)(10-15、白、一年草、水田などの湿地)27
22189 シラタマホシクサ(*Eriocaulon nudicuspe*)(15-40、白、1年草、静岡愛知三重、絶滅危惧 II 類)24,26
22200 ゴマシオホシクサ(*Eriocaulon senile*)(10、黒藍、一年草、本州から九州、絶滅危惧 I B類)27



- 22207 ホウキボシイヌノヒゲ(*Eriocaulon* sp.)(学名は未定、20-5、白、一年草、湿地、宮崎県の絶滅危惧 I A類)27,90

-----【ボタン科】-----

- 22233 ヤマシャクヤク(*Paeonia japonica*)(30-50、白、柱頭が少し曲がるのがヤマシャクヤク、関東から九州)1,5,7,20,21,22,26
22233-1 ヤマシャクヤク(赤花)(*Paeonia japonica*)20,21
22235-2 シャクヤク(パエオニア ラクティフロラ)園芸種(*Paeonia lactiflora*)(70-80、)[淡いピンク、二重]1



22235-3 シャクヤク(パエオニア ラクティフロラ)園芸種(*Paeonia lactiflora*)(70-80、)[淡いピンク、多弁]1



22247 ベニバナヤマシャクヤク(*Paeonia obovata*)(40-50、赤、柱頭が巻き込んでいるのがベニバナヤマシャクヤク、北海道から九州、絶滅危惧Ⅱ類)7,22,72,79

22259-4 ポタン(園芸種のセルフ、混合)(*Paeonia suffruticosa mix*)1

-----【マメ科】-----

22440 ネムノキ(*Albizia julibrissin*)(500-1000、落葉小中木、薄いピンク、青森以南、北海道では南部を中心に植栽)21



2025、9、9昨年種子まきした苗です

22505-B ホドイモ(球根)(*Apios fortunei*)(ツル、白緑、日当たりの良い林縁、北海道から九州、地下の塊茎は食用になる)25

22548 ゲンゲ(通称:レンゲ、レンゲソウ)(*Astragalus sinicus*)(25、赤、播種は秋の彼岸ごろ(関東標準))[秋播きのため、26年秋に播種のこと、冷蔵庫保管]22

22549 ゲンゲ白花(通称:レンゲ、レンゲソウ白花)(*Astragalus sinicus white fl.*)(25、白、播種は秋の彼岸ごろ(関東標準))[秋播きのため、26年秋に播種のこと、冷蔵庫保管]22

22640 ハナズオウ(ハナスオウ)(*Cercis chinensis*)(300、紅、中国原産)1,22

22695 クリトリア(チョウマメ)(*Clitoria ternatea*)(ツル、青紫、熱帯性)22

22722 タヌキマメ(*Crotalaria sessiliflora*)(40、青、一年草、本州から沖縄)1317,28,30

22770 フジカンゾウ(*Desmodium oldhamii*)(50-150、赤、本州から九州)19

22934 トウコマツナギ(*Indigofera bungeana*)(40-100、赤紫、緑化用に中国から導入)28

22939 コマツナギ(*Indigofera pseudotinctoria*)(80-150、落葉小低木、赤)17

22965 キングサリ(*Laburnum anagyroides*)(500-700、黄、別名キンレイカ、ヨーロッパ南部原産)22

23320-W (W)トキリマメ(*Rhynchosia acuminatifolia*)(ツル、黄、関西以西から九州、タンキリマメに比べて葉の下半分の幅が広い)[愛知県]1

23322 タンキリマメ(*Rhynchosia volubilis*)(ツル、黄、関西以西沖縄まで、トキリマメに比べて葉の下半分の巾が狭い)17,28

23322-W (W)タンキリマメ(*Rhynchosia volubilis*)(ツル、黄、関西以西沖縄まで、トキリマメに比べて葉の下半分の巾が狭い)[愛知県]1,88

-----【ミズアオイ科】-----

23710 ミズアオイ(*Monochoria korsakowii*)(花系30-70、青、一年草、水田・沼地、常時水要)1

-----【ミズキ科】-----

23730 ヤマボウシ(*Benthamidia japonica*)(500-1000、落葉小高木、薄黄、本州から九州)1

-----【ミソハギ科】-----

23831 エゾミソハギ(*Lythrum salicaria*)(50-150、赤紫、北海道から九州)14

-----【ミツバウツギ科】-----

23870 ゴンズイ(*Euscaphis japonica*)(落葉小高木、淡黄緑色、関東以西九州)13

-----【ムラサキ科】-----

24205 オオルリソウ(*Cynoglossum zeylanicum var. villosulum*)(60-70、青、二年草、)27

-----【モクレン科】-----

- 24689 オガタマノキ(別名玉神木)(*Magnolia compressa*)(1000-1500、花の色は白、匂いはバナナの匂い、常緑高木、中国原産)[提供者から:挿し木後30年後に花をつけた、交換会:モフミンで保湿]3
- 24692-W (W)コブシ(*Magnolia praecocissima*)(500-1800、落葉高木、白、北海道から九州)[長野県]72
- 24696 オオヤマレンゲ(*Magnolia seiboldii* ssp. *japonica*)(200-500、落葉低木、白、関東から九州)72
- 【ヤマゴボウ科】-----
- 25000-1 ジュズサンゴ(ピンク実)(*Rivina humilis*)(30、ピンク実、耐寒性弱い、北アメリカ南部から南アメリカ)32,33
- 【ヤマノイモ科】-----
- 25021-1B ナガイモ(斑入り)(ムカゴ)(*Dioscorea batatas*)(ツル、黄緑、)26
- 25026-B ヤマノイモ(ムカゴ)(*Dioscorea japonica*)(ツル、雌雄異株、北海道南西部から九州)1
- 25026-W (W)ヤマノイモ(*Dioscorea japonica*)(ツル、雌雄異株、北海道南西部から九州)[愛知県]1
- 25026-WB (W)ヤマノイモ(ムカゴ)(*Dioscorea japonica*)(ツル、雌雄異株、北海道南西部から九州)[愛知県]1
- 【ユキノシタ科】-----
- 25192 アラシグサ(*Boykinia lycoctonifolia*)(20-40、黄緑、日本固有種、北海道本州中部以北)14
- 25355 サキシフラガ ケスピトサ(*Saxifraga cespitosa*)(5、白、北極に近いような気候の高山帯)[流通名、洋種クモマグサ]14
- 25379 ダイモンジソウ(*Saxifraga fordunei* var. *incisolobata*)(10、白、関東以西九州まで)1
- 【ユリ科】-----
- 26258-EB オニユリ(3倍体、ムカゴ)(*Lilium lancifolium*)(40-80、朱、北海道から九州、中国原産)86
- 26259-B オウゴンオニユリ(黄金鬼百合)(ムカゴ)(*Lilium lancifolium* var. *flaviflorum*)(オニユリの黄花変種。対馬特産)4,75
- 26263 コオニユリ(*Lilium leichtlinii*)(80、橙、ムカゴは出来ない、北海道から九州)24,87
- 26305-3 ヒメサユリ(白花種×並花F1のシブリング)F2(*Lilium rubellum*)[25%の確率で白が生まれる]15
- 26308 カノコユリ(*Lilium speciosum*)(100-150、白からピンク、四国九州、絶滅危惧II類)84
- 26520 オオバタケシマラン(*Streptopus amplexifolius* var. *papillatus*)(50-100、白緑、中部以北から北海道)14
- 26552 シロホトトギス(*Tricyrtis hirta* var. *albescens*)(20-50、白、北海道南西部以南、林の中)10,18
- 【ラン科】-----
- 26764 シラン(*Bletilla striata*)(30-40、紫、最も丈夫な野生ランの一つ) 1
- 26767 シラン(ブルー)(縞斑)(*Bletilla striata* var. *coerulea*)76
- 27580 サギソウ(*Pecteilis radiata*)(20-30、白)15
- 【リンドウ科】-----
- 27969-W (W)トウヤクリンドウ(*Gentiana algida*)(10-30、薄黄、中部以北か北海道、高山帯)[山梨県]77
- 28079 リンドウ(ササリンドウ)(*Gentiana scabra* var. *buergeri*)(20-100、青紫、本州から九州)81,85,90
- 【レンプクソウ科】-----
- 28283 ガマズミ(*Viburnum dilatatum*)(200-300、落葉低木、白、赤実、北海道から九州)1
- 28283-1 ガマズミ(黒実)(*Viburnum dilatatum*)22
- 【ロウバイ科】-----
- 28360 ナツロウバイ(*Synocalycanthus chinensis*)(落葉低木、白、浙江省原産)28